



روکاترول یا کلسیتریول

این دارو دارای ویتامین d3 می باشد که برای پایین آوردن کلسیم خون بسیار کاربرد دارد.

شکل دارو: کپسول های ژلاتینی نرم 25/0 میکروگرم در بسته بندی های 90 عددی عرضه میشود.

عوارض: ضعف، سردرد، خواب آلودگی، تهوع یا استفراغ، خشکی دهان، یبوست، درد عضلانی و استخوانی، طعم فلزی در دهان کاهش اشتها و دل درد

مراقبت ها:

- دارو را در دمای کمتر از 25 درجه سانتیگراد، دور از نور، رطوبت و در داخل بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.
- در مصرف غذاهای غنی از کلسیم، فسفات و ویتامین D مثل لبنیات احتیاط کنید.
- از نگهداری و مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- در مصرف فرآورده های حاوی پتاسیم احتیاط کنید.
- از شکستن، خرد کردن یا جویدن کپسول خودداری کنید.
- دارو را همزمان با داروهایی مثل سایمتیدین، رانیتیدین و کلسیترامین و داروهای ضد تشنج (مثل فنی توئین) مصرف نکنید.
- دارو را می توان همراه با غذا یا معده خالی مصرف نمود.



کربنات کلسیم

این قرص ها با فسفری که در روده شما موجود میباشد، ترکیب خواهند شد و از ورود آن ها به جریان خون جلوگیری خواهد کرد.

شکل دارو: به شکل قرص 500 میلی گرمی است.

عوارض: گیجی، تکرر ادرار، بی اشتها، خشکی دهان هذیان

مراقبت ها:

- لازم به ذکر است برای استفاده از این قرص باید آن را پس از صرف غذا با گذشت یک ساعت از آن استفاده کرده تا برای شما اثر گذار باشد.
- لازم به ذکر است استفاده از این دارو با داروهای آنتی بیوتیکی و آهن می تواند اختلال به وجود آورد، اگر هم قصد دارید این داروها را بخورید، سعی کنید که با یک فاصله از هم آن را استفاده کنید.
- در صورت بروز عوارض به پزشک خود اطلاع دهید.
- شناسایی غذاهای پرفسفر و محدودیت مصرف آنها صورت گیرد.
- در دمای 15 تا 30 درجه سانتی گراد در پوشش بسته نگهداری شود.

رناژل

کمک به پایین آوردن فسفر می نماید.


شکل دارو: به شکل قرص های سفید رنگ بیضوی و روکش دار 500 و 800 میلی گرمی می باشد.

عوارض: استفراغ، تهوع، سردرد، کاهش فشار خون

مراقبت ها:

- افراد باید از خوردن آن با داروهای ضد تشنج و وارفارین خودداری نمایند فاصله مصرف رناژل با این داروها حداقل باید 1 تا 3 ساعت باشد.
- رناژل باید همراه غذا مصرف شود.
- اگر فراموش کردید، رناژل را مصرف کنید، رناژل فراموش شده حذف شود و در زمان بعدی خود همراه غذا مصرف شود و از 2 برابر کردن دارو خودداری نمائید.
- دارو در دمای بالای 20 درجه سانتی گراد نباشد.

ارتیروپونتین یا اپرکسی



این دارو جهت کم خونی که در اثر نارسایی مزمن کلیه به وجود آمده است تجویز می شود.

شکل دارو: دارو به شکل آمپول های 2000 واحدی و 4000 واحدی و 10000 واحدی می باشد.

عوارض: افزایش فشار خون، افزایش استعداد بروز لخته

مراقبت ها:

- دارو را در جایی خشک و خنک و به دور از گرما و تابش نور مستقیم نگه دارید. در یخچال با دمای 2 تا 8 درجه نگهداری شود.
- برای مصرف این دارو، لیست تمام داروهایی که مصرف می کنید اعم از داروهای تجویزی و غیر تجویزی (گیاهی، مکمل و ...) را با پزشکتان در میان بگذارید.
- کنترل فشارخون و دقت در مصرف داروهای ضد فشارخون.
- رعایت رژیم غذایی کم پتاسیم.
- از تکان دادن شدید آمپول یا شیشه دارو خودداری نمائید.



ویتامین C (اسکوربیک اسید)



ونوفر (آهن)

برای بالا بردن ایمنی بدن و ترمیم زخم و مقاومت در برابر عفونت ضروری است.

آمپول آهن می باشد که یک مکمل غذایی است در بیماران دیالیزی که دچار فقر آهن می باشند تجویز می شود.

شکل دارو: ویتامین C به شکل قرص جوشان هزار میلی گرمی و فرم تزریقی در آمپول های 5 سی سی موجود می باشد.

شکل دارو: به صورت آمپول های 100 میلی گرمی میباشد.

عوارض: تهوع، استفراغ، اسهال، سوزش سردل و دل درد

عوارض: افت فشار خون، سردرد، تهوع، استفراغ، درد مفاصل درد عضلانی، سرگیجه، درد قفسه سینه، احساس طعم فلز در دهان.

مراقبت ها :

مراقبت ها :

- آمپول در معرض آفتاب قرار نگیرد و در صورت تیره شدن قابل استفاده نمیشود.
- قرص اگر همراه با غذا مصرف شود جذب بهتری خواهد داشت.

- در صورت بروز عوارض حتما اطلاع داده شود.
- حتما در مراکز درمانی تزریق شود.
- نیاز به نگهداری در یخچال ندارد.
- در زمان تجویز قرص آهن قطع شود.



کمیته دانشجویی توسعه آموزش
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

موضوع:

داروهای مصرفی دیالیز

گردآورنده:

آیدا اباذری

1400

هیپارین



مانع از تشکیل لخته می شود.

شکل دارو: به صورت تزریقی مصرف میشود و جذب خوراکی ندارد. هر آمپول 500 واحد است

یک ویتامین است که کمک به جبران کم خونی شما می کند و کم خونی ایجاد شده از نارسایی کلیه را کنترل و درمان می کند.

عوارض: تهوع، استفراغ، خونریزی، پوکی استخوان

شکل دارو: به شکل قرص های 1 و 5 میلی گرمی است. در بیماران دیالیزی قرص های 5 میلی گرمی کاربرد دارند.

مراقبت ها :

مراقبت ها :

- در صورت مصرف هیپارین از تزریق عضلانی سایر داروها به دلیل احتمال بروز هماتوم و خونریزی در اطراف محل تزریق خودداری شود.
- در صورت خونریزی از لثه و بینی فوراً به پزشک اطلاع دهید.

عوارض: راش، قرمزی، خارش، ضعف عضلانی

- دارو در ظرف مقاوم به نور نگهداری شود.
- طبق دستور پزشک مصرف شود.
- در صورت حساسیت به پزشک اطلاع دهید.